

## 【定期予防接種の対象年齢と接種間隔・接種方法】

令和6年4月現在

予防接種名		対象年齢	接種回数	接種間隔（標準的接種）	最終接種期限
□ タ	□タリックス	出生6週0日後（生後約1か月半） ～24週0日後（生後約5か月半）	2回	生後2か月から出生14週6日後（生後約3か月と10日）までに1回目、2回目は27日以上の間隔をおいて1回。	1回目は出生14週6日後まで 2回目は出生24週0日後まで
	□タテック	出生6週0日後（生後約1か月半） ～32週0日後（生後約7か月半）	3回	生後2か月から出生14週6日後（生後約3か月と10日）までに1回目、2回目、3回目は27日以上の間隔をおいて1回ずつ。	1回目は出生14週6日後まで 3回目は出生32週0日後まで
B型肝炎		1歳未満	3回	27日以上の間隔で2回。更に、1回目から139日以上の間隔をおいて1回。	1歳の誕生日前日まで
小児用 肺炎球菌	接 回 種 数 開 が 始 異 年 齢 で	生後2か月～6か月	4回	標準的には1歳までに27日以上の間隔をおいて3回。追加接種（4回目）は1歳から1歳3か月までを標準的な接種間隔として、3回目終了後60日以上の間隔をおいたあとであって、1歳以上で1回。★	5歳の誕生日前日まで
		生後7か月～11か月	3回	標準的には1歳までに27日以上の間隔をおいて2回。追加接種（3回目）は2回目終了後、60日以上の間隔をおいたあとであって、1歳以上で1回。★	
		1歳	2回	60日以上の間隔で2回。	
		2歳～4歳	1回	—	
五種混合		生後2か月～7歳6か月未満	4回	20日以上、標準的には56日までの間隔をおいて3回。追加接種（4回目）は3回目終了後6か月以上の間隔をおいて1回（標準的には6か月から1年6か月を経過した者）。	7歳6か月の誕生日前日まで
BCG		1歳未満	1回	—	1歳の誕生日前日まで
麻しん風しん 混合	1期	1歳～2歳未満	1回	—	2歳の誕生日前日まで
	2期	年長児	1回		3月末日
水痘		1歳～3歳未満 （水痘罹患者は対象外）	2回	1回目は、標準的には1歳から1歳3か月までに1回。2回目は、1回目終了後3か月以上、標準的には6か月から1年までの間隔をおいて1回。	3歳の誕生日前日まで
日本脳炎	1期	生後6か月～7歳6か月未満	4回	標準的接種は3歳から4歳までに6日以上、28日までの間隔をおいて2回。追加接種（3回目）は2回目終了後6か月以上、標準的にはおおむね1年の間隔をおいて1回。 2期は標準的接種として9歳から10歳までに1回。	7歳6か月の誕生日前日まで
	2期	9歳～13歳未満 （小学4年生）			13歳の誕生日前日まで

★小児用肺炎球菌は、標準的接種間隔で接種できなかった場合、回数・間隔が異なってきますので、間隔を守って受けましょう。