

内服薬と献血適否について

いずれも薬の成分による献血の可否判断であり、治療中の病気の状態や当日の体調から、**医師が総合的に判断**し、献血の適否を決めます。

降圧剤（血圧を下げる薬）	当日でも○	合併症がなく、血圧がほぼ正常にコントロールされている場合は献血可。
抗アレルギー薬 （花粉症、鼻炎、アトピー等）	当日でも○	セレスタミン等ステロイド含有薬を除く。 ステロイド含有薬服用の場合は3日間献血不可。
胃腸薬	当日でも○	潰瘍治療薬の予防的服用であれば可。 潰瘍がある場合は治癒するまで献血不可。
高脂血症治療薬 （コレステロールを下げる薬）	当日でも○	
緩下剤（便秘薬）	当日でも○	
痛風・高尿酸血症治療薬	当日でも○	
前立腺肥大症治療薬	当日でも○	アボダート、アボルブ、ザガーロ、プロスカー、プロペシア等を除く。
解熱鎮痛消炎剤 （痛みどめ、熱さまし）	前日までなら○	
睡眠薬・抗不安薬	前日までなら○	体調等を考慮して献血可否の判断をします。
市販のかぜ薬	前日までなら○	かぜの症状がある場合は、安全を考慮して献血をお断りすることがあります。
病院処方のかぜ薬	3日間献血不可	
抗生物質 抗真菌剤・抗ウィルス剤	3日間献血不可	
抗うつ薬	3日間献血不可	
強心薬・抗不整脈薬・ 狭心症治療薬	献血不可	
糖尿病薬	献血不可	食事療法のみの場合で、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経症を合併していなければ献血可。